

AtlantaSeed

by AgroBioSeed

HOB!



СНІСКУ ІМІ

СЛЪНЧОГЛЕД CON-OIL

- Хибрид слънчоглед IMI тип „Конойл“.
- Устойчивост на хербициди: имазамокс.
- Основен пазар: храна за птици и белачната индустрия (тип конфекشنъри грейг).
- Размер: среден; около 12 мм дължина и 5 мм ширина.
- Цвят: бял шарен.
- Средно ранен вегетационен период: 110 дни.

Спецификация

1. **Препоръчителна сеитбена норма:**
 - за белене: 4000 – 4500 семена на декар;
 - за храна за птици: 6000 – 6500 семена на декар.
2. **Подходящо време за сеитба:** Температурата на почвата трябва да надвишава 12°C преди сеитба.
3. **Добивен потенциал:** >400 кг/дка.
4. **Кълняемост:** Гарантиран минимум >85%.
5. **Третиране на семената:** Семената са третирани с фунгицид.
6. **Хербицидна технология:** Чики е хибрид тип IMI. Може да се прилага нормална дозировка на хербициди на базата на имдазолинон. Например, Pulsar CL40 може да се използва.
7. **Препоръка за хербициди:** Препоръчва се култивиране между редовете. Могат да се прилагат почвени хербициди, които обикновени се използват за слънчогледови полета. Например, хербицидът Gardgrim Plus Gold се препоръчва в доза 0,45 л/дка. Трябва да се приложи веднага след сеитбата, до три дни след сеитбата. Освен това, Helianthex може да се прилага 4,5 мл/дка, след 4-ти лист до бутонизация. За житни плевели препоръчва се Fusilade Forte 150 EC. Този хербицид трябва да се прилага в доза 100–130 мл/дка. Прилага се по време на фаза 3-ти до 5-ти лист на растеж на плевелите. Силно се препоръчва механично и/или ръчно култивиране, когато плевелите са агресивни.
8. **Препоръка за торене:** 25 кг/дка тор NPK преесеитбено. 10 кг/дка амониева селитра (N) през вегетационния период. 5–6 кг/дка калий (K) през вегетационния период. Прилагане на течен бор (B) преди цъфтежа е силно препоръчително (внимание: бъдете внимателни и прецизни при дозирането, тъй като лесно може да възникне борна токсичност).
9. **Препоръка за фунгицид:** за защита от болести, например, милдуум, препоръчваме фунгицид PICTOR SK в доза 60 мл/дка. Прилага се веднъж на етап 2–4 двойки листа и отново преди цъфтежа.
10. **Подходящ тип почва:** При възможност да се отглежда на богати и силни почви с неутрално pH. Семената и растенията се нуждаят от вода. Песъчливите почви изискват напояване.
11. **Средна височина на растението:** 160–170 см.
12. **Позицията на питите:** Леко извити надолу.
13. **Устойчивост на полягане:** Добра.
14. **Задържане на семената (след узряване):** Семките се задържат много добре върху питата и не се оронват при жътва.
15. **Устойчивост към синя китка:** Толерантен към синя китка, раси (OR 6).
16. **Устойчивост на болести:** Толерантен към Мана (A-G), Ръжда, Фома, Фомопсис и Алтернария.
17. **Склонност към гъбично замърсяване (готова продукция):** Семената са лъскави и чисти. Не се наблюдават гъбички по повърхността на семената след прибиране на реколтата.
18. **Тип опаковка:** Семената са опаковани в петслойни, изолирани, хартиени торби с марка AtlantaSeed.
19. **Палетиран транспорт:** Да.
20. **Етикетирание и сертифициране:** Съответства на законодателството и стандартите на ЕС. Торбите са маркирани със син етикет, сертифициран от OECD/ISTA. Ще бъде предоставен сертификат за качество ISTA/OECD. Наличен фитосанитарен сертификат и сертификат за произход.



АГРО БИО СЕМЕНА

АГРО БИО СЕМЕНА ООД

София GSM: 0885 026548
Добрич/Варна GSM: 0889 560238;
0889 996267
Пловдив/Пазарджик GSM: 0888 826514

Видин GSM: 0887 600195
Плевен GSM: 0899 985222
Силистра Дистрибутор Сумит Снег ООД
GSM: 0894 459690

e-mail: office@agrobioseed.com • www.agrobioseed.com

Моля, имайте предвид, че предоставените препоръки се основават на общи насоки и може да не доведат до желаните резултати при всички условия. Никакви права не могат да бъдат запазени. Препоръчва се да се консултирате със земеделски експерт, за да приспособите тези препоръки към конкретни ситуации.